



Національна академія медичних наук України

Державна установа

„ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ”

61068 Харків, вул. Академіка Павлова, 46

тел./факс 738 33 87 – директор; тел. 738 41 94 – головний лікар

E-mail: [inpn@ukr.net](mailto:inpn@ukr.net)

[www.inpn.org.ua](http://www.inpn.org.ua)

код ЄДРПОУ 02012148

24.10.16 № 456

На \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Результаты клинического исследования эффективности и безопасности  
применения пчелиного маточного молочка.

В отделении детской психоневрологии и пароксизмальных состояний ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины» было проведено изучение эффективности и безопасности продукта пчеловодства – лиофилизированного пчелиного маточного молочка в комплексном лечении детей, страдающих тикозными гиперкинезами, торговой марки «Медок» ([www.medok.com](http://www.medok.com)), которое зарегистрировано и разрешено к применению в Украине.

Это натуральное пчелиное маточное молочко, которое было высушено в вакууме путем заморозки при температуре минус 30°C на протяжении 24 часов и сохранило высокую биологическую ценность.

Общеизвестно, что одной из разновидностей тикозных расстройств являются тики, которые провоцируются ОРВИ, ангинами, обусловленными стрептококковой инфекцией - PANDAS-синдром, или «педиатрическое аутоиммунное нейropsychическое расстройство, связанное со стрептококковой инфекцией».

Большое значение в возникновении различных инфекций у детей, их рецидивах играет состояние иммунитета. Возникновение вторичных

иммунодефицитов часто связывают с инфицированностью вирусами группы герпеса, которая в общей популяции достигают 50-90 % .


Лиофилизированное маточное молочко применялось для лечения 23 детей, страдающих гиперкинезами, у которых был диагностирован PANDAS-синдром, в виде капсул по 1 капсуле (350мг) – 2 раза в день в течение 1-го месяца. Пациенты продолжали наблюдаться в отделении в течение 6 месяцев после лечения.

Применение лиофилизированного маточного молочка ТМ «Медок» (www.medok.com) в комплексном лечении детей с хроническими тикозными расстройствами способствовало улучшению состояния в виде исчезновения проявлений заболевания в 91,30 % случаев против 27,27 %, когда в схемы лечения не было включено пчелиное маточное молочко. Улучшение было стойким и держалось в течение всего периода наблюдения. Побочных эффектов при применении маточного молочка мы не наблюдали.

Таким образом, лиофилизированное маточное молочко ТМ «Медок», показало высокую эффективность и безопасность и может широко использоваться в детском возрасте, в том числе в комплексном лечении детей, страдающих тикозными гиперкинезами.

Директор ГУ «Институт неврологии,  
психиатрии и наркологии НАМН Украины»  
д.м.н. профессор



  
П.В. Волошин

Зав. отделом детской психоневрологии  
и пароксизмальных состояний  
д.м.н.



Л.Н. Танцура